小伙提着锤子大步走进诊室！

虚惊一场，结局很暖心……

近日，在浙江大学明州医院骨科病区，出现了戏剧性的一幕。

明州医院脊柱外科张军副主任医师刚到诊区还没开始叫号，就见一个壮小伙低着头，手上拿个锤子大步走了进去。

见到锤子时，张军心头不由紧了下，结果没等开口，就见壮小伙从兜里利索掏出个钉子嘭嘭敲了几下，转头把塞在手提袋的锦旗给挂到了墙上。

原来，壮小伙顾先生的爸爸是张军主任的一位患者，因为长期膝关节痛无法正常生活，别说走路，就连好好睡一觉都是奢望。

几经治疗周转后，经朋友介绍找到了张军主任。

张主任看了他之前的手术报告和检查结果，明确病因是膝关节韧带周围无菌性炎症，便采取了“打针”的治疗方式。

“关节周围都是软骨，这个部位的血管少血供较差，所以一般口服药起效慢起效难，而打针可以直接把药物送到病变处，效果往往更好。”张主任说。

果然，顾先生的爸爸在年前打了一针后，疼痛不适显著缓解，虽然还不能正常行走，但因为终于能睡个整觉，人也不那么难受了，精神面貌大大改善，用顾先生的话来说，脾气都好了不少。

于是，顾爸爸叮嘱儿子订制一面锦旗感谢张主任。考虑到张主任可能没时间挂，顾先生干脆带上锤子、钉子，自己动手让锦旗上墙。

“别看只是打针，其实很有讲究。”张军告诉患者们。

首先，是打针的位置。

因为病变处“潜伏”在身体内，让患者自己找往往都找不准，但张军根据患者描述一按，就能听他们惊奇地说，“对对对，就是这儿”。

“在患者眼里看到的是皮肤，在我眼里就是骨头、血管等解剖结构，跟透明的一样，所以我能快速找对地方。毕竟，只有打到了病变处，药物才能发挥作用。”

其次是药物的成分、剂量。

“不同部位、不同病情，药物的成分和剂量都有差异。”据张军介绍，不同于传统认识中的“封闭针”，这个针注射后不会出现局部骨质疏松、韧带钙化等副作用，而且消炎镇痛的效果会更好。

一周一针，一般只要2-3次，就可以结束治疗，而且费用纳入医保，价格低廉，这让不少患者大呼方便。

记者 陆麒雯 通讯员 姚璐璐

16岁男孩睡梦中惊醒 起来发现“蛋疼”紧急送医

宁波市杭州湾医院急诊科近日收治了一位16岁男孩，他因为在睡醒后突然感觉右边阴囊剧烈疼痛收入医院。专家提醒，“蛋疼”真不是开玩笑，如果是睾丸扭转，必须在6小时内进行救治。

“医生，医生，快帮忙看看我儿子，他疼得不行了！”近日，16岁的彬彬（化名）在父母的搀扶下，急匆匆地来到杭州湾医院泌尿外科求诊。

“我儿子早上刚睡醒，就发现右边的阴囊突然开始痛得厉害，我们先去了附近的医院，做了个B超，医生说情况不太好……”说起孩子的情况，父母满脸焦急。

接诊的医生朱佳奇注意到，问诊过程中，男孩表情痛苦，双手一直捂着下体。经过仔细检查，朱医生发现男孩右侧睾丸触痛明显，托举后疼痛加重。朱佳奇当机立断：“很可能是睾丸扭转，赶紧查超声！”

超声检查结果一出，朱医生马上向来自上海仁济医院的泌尿外科执行主任陈奇进行汇报。陈主任表示，睾丸扭转的最佳治疗时间是症状发生6小时内，治疗睾丸扭转，一刻都不能耽误，于是联系相关科室尽快安排手术。

手术中发现，彬彬右侧睾丸顺时针扭转180度，颜色暗红。手术中，医生将睾丸复位，同时给予温水湿敷。渐渐地，睾丸色泽逐渐正常，手术顺利结束。术后第二天，彬彬平安出院。

专家介绍，睾丸扭转又称为精索扭转，是由于睾丸和精索本身的解剖异常或活动度加大引起的扭转，使精索内的血液循环发生障碍，引起睾丸缺血、坏死。可发生于任何年龄段，主要发生于10～30岁，是青少年阴囊急性肿痛的重要原因。睾丸扭转的症状通常表现为一侧阴囊的突发剧烈疼痛，有时于睡梦中痛醒。患者疼痛侧睾丸位置比另一侧抬高，触摸有明显的疼痛感，将睾丸举高疼痛会加重。睾丸扭转的最佳治疗时间是症状发生后6小时内，超过6小时，睾丸缺血性坏死的风险会增加。因此，如果感觉阴囊突然出现剧烈疼痛，建议立即就医。

记者 孙美星 见习记者 任诗妤 通讯员 通讯员 邹怡